

**RODENTICIDA
RATICIDA**

TermiXAN

**CEBO A BASE DE
GRANO DE CEREAL
MONODOSICO**

- **Elimina todas las especies de roedores**
- **Alta atracción y palatabilidad**
- **Dosis única**
- **No causa sospechas en la colonia**



Termixan granos es un rodenticida anti-coagulante monodósico a base de Bromadiolone. Con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

Termixan granos esta formulado con una combinación de cereal y sustancias saborizantes que le brindan una excelente palatabilidad, controlando una amplia variedad de roedores. Rápida acción sobre roedores resistentes a warfarina.

Termixan granos es un producto clase IV. Tiene antídoto: Vitamina K1. Para mayor seguridad contiene Bitrex, un disuasivo alimentario para la ingesta involuntaria humana.



**PLAGAS
CONTROL DE PLAGAS**

Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), **Rata negra** (*Rattus rattus*), **Rata gris** (*Rattus norvegicus*), **Rata Alejandrina** (*Rattus rattus var. Alejandrinus*), **Rata Colorada** (*Holochylus brasiliensis*), **Ratón de Campo** (*Holochylus sp. Oryxomis sp. Calomys sp, Akodon sp*).

RODENTICIDA
RATICIDA

TermiXAN

CEBO A BASE DE
GRANO DE CEREALES
MONODOSICO

COMPOSICION

Bromadiolone.....0,005 g
Colorante, atractivos y bitrex c.s.p.....100 g


MODO DE ACCION

Ingestión: Inhibe la formación de la Protrombina necesaria para la coagulación de la sangre causando hemorragias internas fatales para el roedor.

FORMULA MOLECULAR



FORMULA ESTRUCTURAL



PRESENTACION

Potes de 1 kg. y 2,5 kg.
Bolsas de 5 kg. y 25 kg.

MODO DE APLICACION

El cebo, sin tocarlo con las manos, debe disponerse en los distintos sitios en los que se observen signos de presencia (deyecciones, pelos, manchas grasosas, objetos roídos, etc.) y en la vecindad de las cuevas. Colocar los bloques dentro de tubos o cajas que permitan el acceso exclusivo a los roedores, ya que así se sienten más seguros al comer escondidos. La distancia entre cebaderos será de 2 a 8 mts. Mantener en forma ininterrumpida la cantidad de cebo limpio y fresco durante 15 días o hasta que desaparezcan los signos de presencia de roedores.

DOSIS DE APLICACION

Plaga	Aplicación
Ratas	Emplear de 200 a 300 g por cebadero
Ratones	Emplear de 25 a 50 g por cebadero

• Distancia entre cebaderos de 2 a 8 mts.

TOXICOLOGIA

Aguda oral en ratas:

DL50: mayor a 5.000 mg/kg.

Aguda dermal en conejos machos:

DL50: 26.000 mg/kg.

Aguda inhalatoria en rata:


DL50: 0,46 microgramos/lit.

Toxicidad en abejas:


Relativamente no tóxico.

COMPARATIVO MORTANDAD POR INGESTA RODENTICIDA

Monodósico vs. Polidósico
Especie: *Rattus rattus* (adulto)



CANTIDAD DE TERMIXAN GRANOS A INGERIR PARA CAUSAR MORTANDAD EN DISTINTAS ESPECIES DE ROEDORES ADULTOS



REGISTROS

Ministerio de Salud Pública de Argentina - RNPUD N° 0250003
Ministerio de Salud Pública de Bolivia SNS/INSO 951/03

Elaborado y Distribuido por:

Punch Química S.A.

División Sanidad Ambiental

M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela Pcia. Buenos Aires - Argentina

www.giacoxan.com

